



Casa di Cura S. Maria Maddalena
Accreditata con il S.S.N.

Informativa per esami Radiologici con mezzo di contrasto organo-iodato (Urografia, TAC con mezzo di contrasto)

Per l'esecuzione di un esame radiologico che preveda l'utilizzo del mezzo di contrasto (mdc) è necessario essere a digiuno da almeno 6 ore, con l'esclusione dei farmaci abitualmente assunti che possono essere ingeriti con qualche sorso d'acqua.

Dopo l'iniezione per via endovena del mdc si avverte una transitoria sensazione di calore diffusa. E' possibile che durante la somministrazione di mdc iodato si verifichino effetti indesiderati legati a reazioni allergiche che possono essere immediate o ritardate.

In rapporto al grado di severità le reazioni possono essere lievi (nausea, vomito, dolore nella sede di iniezione), moderate (dispnea, ipotensione, tachicardia) o eccezionalmente a rischio per la vita (gravi aritmie, broncospasmo severo, arresto cardiorespiratorio, insufficienza renale acuta).

Le reazioni ritardate (da 1 ora dall'inizio fino a 7 gg) possono consistere in eruzioni cutanee, sindrome similinfluenzale, disturbi gastrointestinali). Nel caso in cui si manifestino reazioni allergiche ritardate è consigliato recarsi in Pronto Soccorso.

Nel caso di pazienti allergici Si consiglia di effettuare la terapia desensibilizzante prima dell'esecuzione dell'esame con contrasto.

Durante l'infusione a bolo del mezzo di contrasto vi è la possibilità che, per cause anatomiche o fragilità della vena, si possa verificare la rottura del vaso con conseguente stravasamento del mdc: in questo caso la tumefazione viene trattata con pomate sintomatiche e impacchi caldo-umidi, eventualmente da proseguire a domicilio.



Casa di Cura S. Maria Maddalena
Accreditata con il S.S.N.

SEZIONE RISERVATA AL MEDICO RICHIEDENTE L'INDAGINE

(Medico di Base, Medico Specialista ovvero Medico di Reparto qualora si tratti di paziente ricoverato)

Sig./ra _____ Nato/a il _____

Indagine Richiesta: _____

Quesito Clinico: _____

L'esame clinico-anamnestico

NON DIMOSTRA

DIMOSTRA

l'esistenza delle seguenti controindicazioni alla somministrazione e.v. di m.d.c. iodato

mieloma Multiplo

paraproteinemia di Waldenstrom

insufficienza renale grave

insufficienza epatica grave

ipertiroidismo

grave insufficienza cardiocircolatoria

stato di gravidanza

NON DIMOSTRA

DIMOSTRA

la presenza di patologie o reazioni allergiche, in particolare:

asma bronchiale

precedenti reazioni anafilattiche

reazioni allergiche alle betalattamine Allergie alimentari

Dermatiti allergiche da contatto

*In tale evenienza si consiglia di effettuare la seguente **terapia desensibilizzante***

	<i>Sera precedente</i>	<i>Mattina dell'esame</i>
<i>Cetirizine cpr 10 mg</i>	<i>1 cpr</i>	<i>1 cpr</i>
<i>betametasone sodio fosfato cpr 0,5 mg</i>	<i>2 cpr</i>	<i>2 cpr</i>

Terapia farmacologica in corso (con particolare riguardo agli anti-ipertensivi):

E' consigliabile l'astensione dalla somministrazione di principi attivi della classe dei biguanidi e dei benzodiazepinici nelle 48 ore precedenti e successive alla somministrazione di mezzo di contrasto iodato

Data _____ ora _____

Timbro e firma del Medico Richiedente l'indagine _____